CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Doporučený postup

- **Proplach potrubí**
  (ASiRAL AC, S)
- **Dezinfekce pracích a nebo jednorázových utěrek**
  (Euterwasch)
- **Naplnění aplikátorů prostředkem po dojení**
  (Barriere Dip, Doppel Film Dip, Chlórhexidín Dip, Doppeldip)
- **Odstřik oddojení mléka, minimálně 4 odstřiky**
  (oddojovací nádoba)
- **Test mléka při podezření na onemocnění, preventivní kontrola apod.**
  (Testovací set - CELL Check 3S)
- **Oplach a dezinfekce vemene**
  (Euterwasch)
- **Dojení**
- **Ošetření vemene po dojení**
  (Barriere Dip, Doppel Film Dip, Chlorhexidin Film Dip, Doppeldip)
- **Ošetření vemene mastmi bez ochranné lhůty**
  (Eutergel, Mint plus, Ensbona Blau Plus, Drachenblut, Melksalbe, Pferdesalbe)
- **Ošetření paznehtů**
  (Klauen Sprint)
- **Sanitace a dezinfekce dojícího příslušenství**
  (eimü-30, Ferdei Rox)
- **Vyčištění aplikátorů (před i po dojení)**
- **Proplach potrubí**
  (ASiRAL AC, S)
- **Čištění podlah, stěn dojírny**
  (ASiRAL SRC, Newfoam S, San CA, CSP)
- **Proplach mléčného tanku**
  (ASiRAL AC, S)

Řešení pro jednotlivé situace

Zasušení krav (DRY-DIP)
Filtrace mléka (filtre KALF)
Plošná dezinfekce stájových prostorů (eimü-30)
Čištění kanalizačních vpustí, dezinfekční brody (Chlórnan vápenatý 45%)

PROPLACH POTRUBÍ

ASiRAL AC (alkalický)

Prostředek na čištění a dezinfekci potrubí, mléčných tanků, konví, na bázi aktivního chloru.
Pracovní koncentrace 0,5%.

ASiRAL S (kyslý)

Čištění potrubí od mléčného a vodního kamene.
Pracovní koncentrace 0,5%.

DEZINFEKCE PRACÍCH NEBO JEDNORÁZOVÝCH UTĚREK

EUTERWASCH

Prostředek na dezinfekci utěrek.
Dávkování: pumpičkou dva stříky na 10litrů vody.
V pracovním roztoku mohou být utěrky namočené až 3 dny. Voda nesmí přesáhnout teplotu 45°C. Při vyšší teplotě dochází k znehodnocení dezinfekční složky. Lze aplikovat i jako pěnu prostřednictvím aplikátoru.

TEST MLÉKA

CELL-CHECK 3S

Testovací set obsahuje: testovací misku, dávkovací pumpičku pro přesné dávkování a testovací kapalinu s vysokou citlivostí už od 100 000 BE.

Pracovný postup:

1. Oddojit první střiky do oddojovací nádoby.
2. Oddojit z každé čtvrtě vemene malé množství mléka zvlášť do jednotlivých částí misky.
3. Opatrně odlít přebytek mléka po vyznačenou risku na misce.
4. Dávkovací pumpičkou aplikovat jeden střik testovací kapaliny do každé části na misce.
5. Opatrně promíchat a mírně naklonit.
6. Určit výsledky z každé čtvrtě viz. barevné schéma na zásobníku testovací kapaliny.

Zánět mléčné žlázy je jedním z nejdražších onemocnění.

OPLACHOVÁNÍ A DEZINFEKCE VEMENE

EUTERWASCH:

Prostředek na omývání a dezinfekce vemene.
Dávkování: dva stříky dávkovací pumpičkou na 10 litrů vody. Poté umýt prací textilní nebo jednorázovou utěrkou namočenou v pracovním roztoku s teplotou do 45°C.

Prostředek je možné aplikovat napěňováním v koncentraci 10%, tj. jeden střik dávkovací pumpičkou přímo do napěňovacího aplikátoru a doplnit vodou.

V případě použití pracích utěrek používejte vždy jednu utěrku na jedno zvíře. Výrazně snížíte riziko přenosu bakterií z nemocných zvířat na zdravé.

OŠETŘENÍ VEMENE PO DOJENÍ

BARIERE DIP:

Prostředek na bázi kyseliny mléčné. Aplikuje se ponořením struku do neředěného prostředku do hloubky přibližně dva cm, bezprostředně po dojení. Na ošetřeném struku vytváří několik hodin hustý ochranný film, s viditelným červeným zbarvením.

CHLORHEXIDIN FILM DIP:

Prostředek na bázi Chlorhexidinu. Aplikuje se ponořením struku do neředěného prostředku do hloubky přibližně dva cm, bezprostředně po dojení. Na ošetřeném struku vytváří několik hodin hustý ochranný film, s viditelným zbarvením. Usmrcuje všechny druhy původců mastitid (bakterie, viry, kvasinky, plísně a spory).

Prostředek použít v případě zhoršeného zdravotního stavu zvířat nebo zvýšené citlivosti ošetřovatelů na jod.

www.ronchem.sk

OŠETŘENÍ VEMENE PO DOJENÍ

DOPPEL FILM DIP:

Prostředek na bázi speciálního typu jodu (nonoxinol-9, jod). Aplikuje se ponořením struku do neředěného prostředku do hloubky přibližně dva cm, bezprostředně po dojení. Na ošetřeném struku vytváří několik hodin hustý ochranný film, s viditelným červeno-hnědým zbarvením. Usmrcuje všechny druhy původců mastitid (bakterie, viry, kvasinky, plísně a spory).

Prostředek použít v prostředí zvýšeného bakteriálního zatížení a zhoršeného zdravotního stavu zvířat.

DOPPELDIP:

Prostředek na bázi speciálního typu jodu (nonoxinol-9, jod). Aplikuje se ponořením struku do neředěného prostředku do hloubky přibližně dva cm, bezprostředně po dojení.
Na ošetřeném struku vytváří několik hodin hustý ochranný film, s viditelným červeno-hnědým zbarvením. Speciální konzistence má rychlý a hloubkový účinek. Usmrcuje všechny druhy původců mastitid (bakterie, viry, kvasinky, plísně a spory).

Prostředek použít v případě velkých a opakujících se problémů (mastitid).

OŠETŘENÍ VEMENE MASTMI BEZ OCHRANNÉ LHŮTY

- **Zánět po otelení (krvavé mléko)**

EUTERGEL:

Gelový, rozdojovací balzám s rostlinnými oleji. Pomáhá při horečce, zánětu a otoku, především po otelení. Podporuje zvýšení produkce mléka rozšířením mléčných kanálků, působí antistresově.
Pracovní postup: nabrat gel do dlaně a důkladně vmasírovat na postižené místo.

U dojnic s otokem vemene provádět masáž několikrát denně.

- **Vločky v mléce - začínající mastitida**

ENSBONA BLAU PLUS:

Proniká hluboko do kůže, chladí a prokrvuje postižené místo, čímž pomáhá léčit zánětlivé procesy ve vemeni. Regeneruje mléčnou tkáň při zánětlivých procesech.

Pracovní postup: důkladně vmasírovat na postižené místo podle potřeby i několikrát denně.

www.ronchem.sk

OŠETRENIE VEMENA MASŤAMI BEZ OCHRANNEJ DOBY

- **Horečnaté stavy vemene, kloubů a šlach**

MINT PLUS:

Silně chladivý, vysoko účinný balzám. Dokáže snížit horečku až o 3,5 °C u vemene, kloubů, svalů, šlach.
Obsahuje 35% japonského peprmintového oleje.
Pracovní postup: vmasírovat asi 10ml (jednu polévkovou lžíci) na postižené místo. Proces opakovat 2-3 dny, případně více do zlepšení stavu.

- **Zapařené vemeno, kastrační a těžko se hojící rány, ekzémy**

DRACHENBLUT - WUNDSPREJ:

Sprej na rány se silným výtažkem z dračí krve (velmi hořký), s rychlým hojivým účinkem postižených míst. Extrémně hořká chuť zabraňuje kanibalizmu.
Sprej se aplikuje dvakrát až třikrát denně do zlepšení stavu.

- **Popraskané a vysušené vemeno**

MELKSALBE:

Tuk na ošetření vemene s přidaným zinkem a alantoinem. Chrání vemeno před popraskáním a nepříznivými povětrnostními vlivy – zimou, větrem, sluncem. Je vhodný na ošetření vemene po ručním i strojním dojení.
Pracovní postup: nanést přiměřené množství na vemeno, v zimním období nanést silnější vrstvu jako ochranu před chladem, větrem.

OŠETŘENÍ PAZNEHTŮ

KLAUEN SPRINT:

Působí hloubkově, okamžitě. Účinný dezinfekční prostředek na ošetření paznehtů, s barevným indikátorem (změna modré barvy na hnědou). Na paznehtech vytváří dlouhodobě antibakteriální, hydroochranný obal. Paznehty intenzivně vyčistí a proniká do nejmenších struktur. Může být použitý při teplotách až do 0°C (do zámrazu) Neobsahuje formaldehyd a těžké kovy, proto může být likvidovaný s hnojem a v bioplynových stanicích.

Použití:

- 0,8% roztok, do bazénů s dobou stání 15-20min., 1X týdně
- 2% roztok, v průchodných vanách, 1X týdně
- přímým postřikem na paznehty v ředění 1:6

Účinnost na mikroorganismy Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Dichelobacter nodosus, Trueperella pyogenes, Fusobacterium necrophorum.

SANITACE A DEZINFEKCE DOJÍCÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

eimü 30:

Speciálně vyvinutý pro mezidezinfekci dojícího zařízení. Přerušuje infekční řetězec mezi zvířaty. Jodový prostředek s barevným indikátorem znečištění pro použití za studena.

- Dezinfekce: aplikátorů, strukových násadců, utěrek, gumových částí nářadí, součástek, zařízení, v koncentraci 1%.
- plošná dezinfekce ve stáji, boudy pro telata 1-3%.

Účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, viry a spory

FERDEI ROX:

Čištění a dezinfekce konví, potrubí, gumových a plastových součástek, nádrží, podlah, stěn, za studena. Odstraňuje tuky, mastnotu, zároveň mléčný, vodní kámen, dezinfikuje. Znečištěná místa zvýrazní žlutě-červeným zbarvením. Obsahuje speciální, velmi rychlou jodovou dezinfekci, účinnou do 1 min.

Použití:

- pro každodenní čištění použít 0,5% roztok, při vyšším znečištění 1%, za studena, max do 45°C.
- Aplikovat ve spreji nebo cirkulací v potrubí či nádrži.

Účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, víry, spory.

www.ronchem.sk

ČIŠTĚNÍ APLIKÁTORŮ (PŘED A PO DOJENÍ)

Aplikátory před opětovným naplněním je nezbytné důkladně vypláchnout, zbavit hrubých nečistot

PROPLACH POTRUBÍ

ASiRAL AC: (alkalický)
Prostředek na čištění a dezinfekci potrubí, mléčných tanků, konví, na bázi aktivního chloru. Pracovní koncentrace 0,5%.
ASiRAL S: (kyslý)
Čištění potrubí od mléčného a vodního kamene. Pracovní koncentrace 0,5%.

ČIŠTĚNÍ PODLAH, STĚN DOJÍRNY
(ASiRAL SRC, NEWFOAM S, SAN CA, CSP)

ASiRAL SRC: Čištění podlah, stěn, pěnou. Odstraňuje tuky, mastnotu, výkaly a zároveň dezinfikuje.
Pracovní postup: stěny opláchnout – navlhčit, nanést pěnu pomocí tlakového zařízení v koncentraci 5 – 10% nechat působit 15 – 20min., opláchnout vodou.

ASiRAL NEWFOAM S:
Odstraňuje vodní kámen a rez, pěnou.
Pracovní postup: stěny opláchnout – navlhčit, nanést pěnu pomocí tlakového zařízení v koncentraci 5 – 10% nechat působit 15 – 20min., opláchnout vodou.

PROPLACH MLÉČNÉHO TANKU

ASiRAL AC: (alkalický)
Prostředek na čištění a dezinfekci potrubí, mléčných tanků, konví, na bázi aktivního chloru. Pracovní koncentrace 0,5%.

ASiRAL S: (kyslý)
Čištění potrubí od mléčného a vodního kamene. Pracovní koncentrace 0,5%.

ŘEŠENÍ PRO JEDNOTLIVÉ SITUACE

ZASUŠENÍ KRAV

DRY-DIP:

Aktivní ochrana struku v období stání na sucho. Prodyšný ochranný film vydrží 7-10 dní. Aplikujeme v den zasušení ihned po zavedení antibiotik, struky krátce ponoříme do neředěného prostředku do hloubky 2 cm.

FILTRÁCE MLÉKA

filtr KALF:

Rukávové filtry o rozměrech:

- 622 x 57
- 455 x 57

PLOŠNÁ DEZINFEKCE STÁJOVÝCH PROSTORŮ

eimü 30:

Rychle působící (do 1 minúty) dezinfekční prostředek s barevným indikátorem na bázi jodu. Byl vyvinutý speciálně pro použití za studena. Max do 45°C. Účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, viry, spory.

Použití:

- plošná dezinfekce ve stájích, boudy pro telata 1-3%.

ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ, DEZINFEKČNÍ BRODY

CHLORNAN VÁPENATÝ 45%:

Granulovaný, pomalu rozpustný prostředek

Aplikace:

- do kanalizačních vpustí nasypat 50-100g (půl až celý šálek), zalít malým množstvím vody tak, aby prostředek zůstal působit v potrubí a nechat působit, pokud je to možné i několik hodin (např. na konci pracovní směny, v noci apod.)
- do dezinfekčních brodů dávkovat 1kg chlornanu na 100 litrů vody, prostředek je účinný 8-12 hodin.